## Note sur quelques espèces du genre cyrtococcum Stapf,

## PAR Mile AIMÉE CAMUS.

Le genre Cyrtococcum, créé par Stapf pour le C. setigerum Stapf (Panicum setigerum P. B. non Retz., P. patens Rendle), espèce d'Afrique tropicale, comprend un certain nombre d'espèces d'Indo-Chine, de Chine, de l'Inde, de la Malaisie, de la Polynésie, de l'Australie, rattachées jusqu'ici à la section Gibbosæ du genre Panicum. Ces espèces présentent entre elles des affinités étroites et forment un groupe bien caractérisé par ses épillets aplatis latéralement, à glumelle inférieure de la fleur supérieure très gibbeuse dorsalement, à glume inférieure très embrassante, à glume supérieure cucullée. Parmi ces espèces, citons:

C. pilipes A. Camus; Panicum pilipes Nees et Arn. ex Büse in Miqu. Pl. Jungh. III, p. 376; P. hermaphroditum Steud.; P. oxyphyllum Hochst.; P. trigonum Nees non Retz.

Tonkin, Annam, Laos, Poulo-Condor, Siam, Cochinchine, Inde, Ma-

laisie, Australie, Mascareignes, Madagascar.

C. trigonum A. Camus; Panicum trigonum Retz. Obs. III, p. 9 (excl. syn. Burm.);

P. difforme Roth.; P. gibbum St.; P. radicans Bühse; P. repens et Burmanni Heyne.

Siam, Inde, Ceylan.

C. patens A. Camus; Panicum patens L. Sp. 58 (1753); P. radicans Retz; P. obliquum Roth; P. accrescens Trin.; P. velutinum Willd.

Chine, Formose, Hong-Kong, Tonkin, Annam, Siam, Cochinchine,

Inde, Polynésie, Malaisie.

Le Panicum Schmidtii Hack., qui paraît assez répandu au Tonkin, en Annam, au Siam, au Laos, en Cochinchine, n'est qu'une variété du Cyrtococcum patens, auquel il est relié par beaucoup d'intermédiaires.

Le Panicum Warburgii Mez n'est probablement qu'une forme appauvrie du Cyrtococcum patens. Warburg et Hackel rattachaient d'ailleurs

cette plante comme variété au Pan. patens.

C. longipes A. Camus; Panicum longipes Wight et Arn. in Wight, Cat. 1638; Hook, Fl. Brit. Ind., VII, p. 58.

Inde, Ceylan.

C. sparsicomum A. Camus; Panicum sparsicomum Nees ex Stend. Syn. Gram. p. 83.

Ceylan.